

Wormgranulaat voor kittens en katten, Fenbendazol.

Indicaties: Ter bestrijding van infecties met onvolwassen en volwassen stadia van de spoelworm *Toxocara cati* en de lintworm *Taenia hydatigena* bij de kat.

Contra-indicatie: Niet gebruiken bij bekende overgevoeligheid voor fenbendazol.

Toedieningswijze: Voor orale toediening. Weeg het dier zorgvuldig voor het bepalen van de juiste dosering. Meng de voorgeschreven hoeveelheid bij voorkeur door het nat (blik) voer van uw kat.

Dosering:

Volwassen katten: 100 mg fenbendazol per kg lichaamsgewicht. (Zogende) kittens tot een leeftijd tot 6 maanden: 50 mg fenbendazol per kg lichaamsgewicht gedurende 3 dagen.

Kittens: Gedurende 3 opeenvolgende dagen de hoeveelheden:		Volw. Katten: Per behandeling de hoeveelheden:	
Lichaamsgewicht	Hoeveelheid	Lichaamsgewicht	Hoeveelheid
0.7 - 1.1 kg	1/4 zakje per dag	1.5 - 2.0 kg	1 zakje
1.2 - 2.0 kg	1/2 zakje per dag	2.1 - 3.0 kg	1½ zakje
2.1 - 3.0 kg	3/4 zakje per dag	3.1 - 4.0 kg	2 zakjes
3.1 - 4.3 kg	1 zakje per dag	4.1 - 6.0 kg	3 zakjes
		> 6.0 kg	4 zakjes

Bijwerkingen: Geen bekend.

Kittens: op de leeftijd van 3, 5, 7 weken, vervolgens maandelijks tot de leeftijd van een half jaar.

Volwassen katten: minimaal 4 maal per jaar. Behandeling na 2 weken altijd herhalen.

Speciale waarschuwingen: Direct contact met de huid zoveel mogelijk vermijden. Handen wassen na toediening. Vermijd de inhalatie van de stof. In verband met mogelijke embryotoxische effecten dient aan het begin van de dracht terughoudendheid met het gebruik van het middel te worden betracht. Niet vermengen met andere diergeneesmiddelen.

Speciale voorzorgsmaatregelen bij bewaren: Buiten het bereik en zicht van kinderen bewaren. Bewaren beneden 25°C. Bewaren in de oorspronkelijke verpakking. Niet in de koelkast of vriezer bewaren. Niet gebruiken na de uiterste gebruiksdatum vermeld op de verpakking.

Speciale voorzorgsmaatregelen voor het verwijderen van ongebruikte diergeneesmiddelen of eventuele restanten hiervan: Ongebruikte diergeneesmiddelen of restanten hiervan dienen in overeenstemming met de nationale vereisten te worden verwijderd.

Inhoud: 4 sachets x 1 g granulaat

Werkzaam bestanddeel: Fenbendazol 222 mg per gram, 222 mg per sachet

Farmacologische vorm: Granulaat

Registratienummer: REG NL 9628

Laatste herzieningsdatum van de bijsluiter: 27 oktober 2008

Uitsluitend voor diergeneeskundig gebruik.

Registratiehouder:

Beaphar B.V.
Drostenkamp 3
8101 BX Raalte (Holland)

Fabrikant verantwoordelijk voor vrijgifte:

Chanelle Pharmaceuticals Manufacturing Ltd.
Loughrea, Co. Galway Ireland

Spoelwormen: deze wormen komen voor in de darmen van katten. Spoelwormen zijn langwerpige, ronde (roze) wormen met spits toelopende uiteinden. De lengte kan variëren tot een tiental centimeters. Niet alleen katten, maar ook de mens kan last hebben van deze wormen. Spoelwormen zijn ziekteverwekkend en kunnen bij het dier zelfs de dood tot gevolg hebben. De wormen worden soms in de ontlasting gevonden, in zeer ernstige gevallen worden ze uitgebraakt. Meestal is een spoelworminfectie niet herkenbaar en derhalve is het treffen van preventieve maatregelen noodzakelijk. De ontwikkeling van jonge dieren wordt bij een spoelworminfectie ernstig verstoord.

De eitjes van spoelwormen kunnen via de moedermelk jonge dieren besmetten, daarom is bestrijding bij jonge dieren van groot belang.

Besmettingsverschijnselen:

- vermagering
- groeivertraging
- doffe vacht
- diarree
- dikke 'wormbuik'

Lintwormen: lintwormen zijn in vergelijking met speelwormen alleen maar hinderlijk. Deze wormen kunnen o.a. worden overgedragen door vlooiën. De lintworm, waarvan de lengte wel tot 50 cm kan oplopen, heeft een kop voorzien van haken en zuignappen waarmee hij zich aan de darmwand kan vasthechten. Achter de kop bevinden zich segmenten van ca. 1 cm lengte. De segmenten die zich los maken van de lintworm zitten vol met lintwormeieren die weer een herbesmetting kunnen veroorzaken.

Besmettingsverschijnselen:

- Verse bewegende lintwormsegmenten rond de anus.
- Als ze opdrogen zien ze eruit als rijstekorrels.
- Segmenten in de ontlasting.

Behandel dieren direct als segmenten in de ontlasting worden aangetroffen. In geval van een lintworminfectie dient de behandeling altijd na een maand herhaald te worden. Heeft het dier last van vlooiën dan moet behandeling om de 6 weken plaatsvinden, zolang er vlooiën aanwezig zijn. Uiteraard zullen ook de aanwezige vlooiën, -larven en -eitjes in de omgeving van uw huisdier behandeld moeten worden.

Wormgranulaat

| Voor kittens en katten

